

## PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

### Phenergan 25 mg tabletter promethazin

**Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.**

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
- Dette legemidlet er skrevet ut til deg.
- Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

#### **I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:**

1. Hva Phenergan er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Phenergan
3. Hvordan du bruker Phenergan
4. Mulige bivirkninger
5. Oppbevaring av Phenergan
6. Ytterligere informasjon

#### **1. HVA PHENERGAN ER, OG HVA DET BRUKES MOT**

Phenergan har sterk effekt mot allergi og virker beroligende.

Phenergan har god virkning mot brekninger.

Phenergan brukes ved behandling av allergiske lidelser og anafylaktiske reaksjoner når det ønskes spesielt kraftig og langvarig virkning. Brukes også som tilleggsbehandling ved narkose, og ved forebygging og behandling av brekninger.

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og /eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som angitt på apoteketiketten.

#### **2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER PHENERGAN**

##### **Bruk ikke Phenergan:**

- hvis du er overfølsom (allergisk) overfor promethazin eller et av de andre innholdsstoffene i Phenergan til barn under 2 år.

##### **Vis forsiktighet ved bruk av Phenergan:**

- Phenergan har en søvndyssende effekt.
- Phenergan må ikke brukes til barn under 2 år grunnet mistenkt fare for åndedrettsstans.
- Bruk av Phenergan bør unngås av barn og unge som viser tegn og symptomer på Reys syndrom.
- Brukes med forsiktighet av astmatikere og ved bronkitt da virkestoffet kan gjøre lungeslimet tykkere og derved minske opphosting.
- Ved langtidsbehandling kan munntørrehet føre til skade på tenner og munnslimhinne.
- Nedsatt tåreproduksjon kan føre til problemer for kontaktlinsebrukere.
- Forsiktighet ved prostatabesvær, magetømmingsbesvær, myasthenia gravis, gulsott, nedsatt nyrefunksjon, alvorlig koronararteriesykdom, grønn stær og epilepsi.

##### **Bruk av andre legemidler sammen med Phenergan:**

Forsiktighet bør vises ved bruk av Phenergan sammen med sterke smertestillende, narkosemidler, alkohol, de fleste midler som brukes ved psykiatriske lidelser og sove- og beroligende midler.

## Graviditet og amming

Phenergan bør ikke brukes av gravide, spesielt ikke i siste del av graviditeten. Rådfør deg alltid med lege eller apotek før bruk av Phenergan under graviditet. Det er ukjent hvorvidt Phenergan går over i morsmelk. Rådfør deg derfor med lege eller apotek før bruk av Phenergan under amming.

## Kjøring og bruk av maskiner

Phenergan har en søvndyssende virkning og ved start av behandling med Phenergan må sjåførere og andre som betjener maskiner være oppmerksom på dette. Startdosen bør være lav.

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

## 3. HVORDAN DU BRUKER PHENERGAN

Bruk alltid Phenergan slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er: en startdose på 1 tablett (25 mg) om kvelden, deretter en eventuell økning til 2–4 tabletter (50–100 mg) de påfølgende kvelder.

### Dersom du tar for mye av Phenergan:

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

## 4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Phenergan forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Phenergan kan gi døsighet, svimmelhet, munntørrhet og sterk uro og krible-følelse i bena ("restless legs"). Mindre vanlige bivirkninger er hodepine, mareritt, treg mage, urinretensjon, bevegelsesforstyrrelser, lavt blodtrykk, forandringer i blodet, minsket tåreproduksjon og lysoverømfintlighet. Allergiske reaksjoner som elveblest, utslett, kløe og anafylaktiske reaksjoner forekommer svært sjelden.

Informér lege dersom noen av bivirkningene bli plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

## 5. OPPBEVARING AV PHENERGAN

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Bruk ikke Phenergan etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

## 6. YTTERLIGERE INFORMASJON

### Sammensetning av Phenergan

- Virkestoff er promethazin.
- Hjelpestoffer er laktose, maisstivelse, magnesiumstearat, povidon, hypromellose, makrogol 200, indigotin (E132) og titandioksid (E171).

### Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker:

[http://www.berneurope.com/de/factsheet/italiano/](#)

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

sanofi-aventis Norge AS, Postboks 133, 1325 Lysaker.

Tilvirker:

Famar Healthcare Services Madrid S.A.U., Alcorcón, Spania

**Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 27.12.2011**

Ordforklaringer til teksten