

Scheriproct

Intendis GmbH Berlin

Antihemoroidemiddel.

ATC-nr.: C05A A04

■ [Prednisolon forbudt iht. WADAs dopingliste](#)

SALVE: 1 g *innh.*: Prednisolonkaproat tilsv. prednisolon 1,5 mg, cinkokainhydroklorid 5 mg, makrogel-400-monoricinoleat, oktyldodekanol, hydrogenert ricinusolje, parfymeolje, ricinusolje.

STIKKPILLER: *Hver stikkpille innh.*: Prednisolonkaproat tilsv. prednisolon 1 mg, cinkokainhydroklorid 1 mg, hardfett.

Indikasjoner: Hemoroider, analfissurer, proktitter.

Dosering: Salve: Vanligvis påføres salven 2 ganger daglig, men inntil 4 ganger den første dagen for å oppnå raskt innsettende lindring.

Stikkpiller: Vanligvis føres 1 stikkpille dypt inn i endetarmen daglig. Ved store plager kan det benyttes 2–3 stikkpiller den første dagen.

Behandlingsvarighet: Salve/stikkpiller: Ofte inntreder det raskt bedring av symptomene. Dette må ikke føre til for tidlig seponering. For å hindre tilbakefall må behandlingen fortsette minst 1 uke etter symptomfrihet, men det kan da benyttes lengre doseringsintervall (salve 1 gang daglig; stikkpille 1 gang hver 2. dag). Total behandlingsvarighet bør ikke overskride 4 uker.

Administrering: Påføres/innføres helst etter avføring. Området rundt endetarmsåpningen rengjøres først. **Salve:** En ertestor mengde smøres i og omkring endetarmsåpningen. Ved bruk av salve inne i endetarmen skrur det vedlagte røret på tuben. Ved betente eller særlig smertefulle prosesser kan det være bedre å påføre salven med fingeren, også på innsiden av tarmen. Fremfallende knuter påføres et tykt lag salve og trykkes forsiktig inn med fingeren. **Stikkpiller:** Myk stikkpille (pga. varme) skal legges i kaldt vann før den tas ut av pakningen.

Kontraindikasjoner: Tuberkulose eller syfilitiske prosesser i området som behandles. Vaccina, variola, varicellae, Herpes simplex. Overfølsomhet for innholdstoffene.

Forsiktighetsregler: Bør ikke anvendes over lengre tid uten at muligheten for malign lidelse er utelukket. Ved soppinfeksjon anbefales tilleggsbehandling. Ved irritasjon eller rektal blødning, må behandlingen avbrytes, pasienten undersøkes nøye og ev. annen terapi påbegynnes. Feilbruk kan maskere eller forverre bakterie-, parasitt-, sopp- eller virusinfeksjon.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Preparater som inneholder kortikosteroider skal ikke brukes i løpet av 1. trimester. Scheriproct skal bare brukes på streng indikasjon, og bare hvis fordelen for moren oppveier en mulig risiko for barnet. Langvarig bruk bør spesielt unngås. **Amming:** Prednisolon går over. Ved topikal bruk anses systemisk eksponering å være liten, og risiko for å påvirke det ammende barnet er lite sannsynlig ved terapeutiske doser. Amming frarådes ved langtidsbruk og ved særlig høye doser.

Bivirkninger: Ved langtidsbruk (>4 uker) kan det forekomme lokale bivirkninger som hudatrofi. I sjeldne tilfeller kan allergiske reaksjoner forekomme.

[Rapportering av bivirkninger](#)

Overdosering/Forgiftning: Ingen risiko. Ved utilsiktet oralt inntak kan systemeffekter av cinkokain forventes (alvorlig kardiovaskulær depresjon, CNS-effekter i form av kramper og respirasjonshemming). Se Giftinformasjonens anbefalinger for prednisolon: Glukokortikoider [H02A B](#) og for cinkokain: [N01B B06](#).

Egenskaper: Virkningsmekanisme: Prednisolon har antiinflammatorisk effekt som gir reduksjon av ødem, hyperemi og kløe. Cinkokainhydroklorid er et lokalanestetikum med smertestillende effekt. **Absorpsjon:** Kortikosteroider absorberes sjelden fullstendig etter rektal applikasjon. Prednisolon: Esteren hydrolyseres sannsynligvis raskt til aktivt prednisolon. **Halveringstid:** Prednisolon: Ca. 3 timer ved i.v. injeksjon. Total plasmaclearance: Ca. 1–3 ml/minutt/kg, øker med dose. **Metabolisme:** Prednisolon: Omdannes i lever til metabolitter som utskilles i urin. Ca. 10–25% utskilles i uendret form. Cinkokain: Gjennomgår oksidasjon og hydroksylering til et antall metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet: Stikkpiller oppbevares i kjøleskap. Kan oppbevares ≤ 2 måneder ved 25°C.

Utlevering: Inntil 30 g salve unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 19.09.2013

(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)

Basert på SPC godkjent av SLV:

17.04.2013

Scheriproct, SALVE:

Styrke	Pakning	Varenr	Pris (kr) ¹	R.gr. ²	Refusjon ³
	10 g	444190	*	F	–
	30 g	118588	*	F	–

Scheriproct, STIKKPILLER:

Styrke	Pakning	Varenr	Pris (kr) ¹	R.gr. ²	Refusjon ³
	12 stk.	118596	53,80	C	–
	Kombinasjonspakn.: 10 g salve + 10 stikkpiller	022061	68,50	C	–

¹ Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

² Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

³ Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. Det kan søkes om [Individuell refusjon](#) for pakninger som ikke har forhåndsgodkjent refusjon.

Ordforklaringer til teksten