

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN**Tetracyclin Actavis 250 mg tabletter**

tetrasyklinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakkingsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

- Ta vare på dette pakkingsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
- Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakkingsvedlegget.

I dette pakkingsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Tetracyclin Actavis er, og hva det brukes mot.
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Tetracyclin Actavis.
3. Hvordan du bruker Tetracyclin Actavis.
4. Mulige bivirkninger.
5. Oppbevaring av Tetracyclin Actavis.
6. Ytterligere informasjon.

1. HVA TETRACYCLIN ACTAVIS ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakkingsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Tetracyclin Actavis er et antibiotikapreparat. Det inneholder virkestoffet tetrasyklinhydroklorid. Det virker hemmende på en rekke bakterier og andre mikroorganismer.

Brukes ved infeksjoner forårsaket av forskjellige typer bakterier og andre mikroorganismer og parasitter. Eksempler på infeksjonssykdommer der Tetracyclin Actavis benyttes: Bronkitt og lungebetennelse, hudsykdommer og seksuelt overførbare sykdommer (spesielt chlamydia). Brukes ved alvorlige former av uren hud (akne vulgaris) der annen behandling ikke har gitt resultater.

Det har ingen effekt på virus f. eks. vanlig forkjølelse og influensa.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER TETRACYCLIN ACTAVIS**Bruk ikke Tetracyclin Actavis:**

- hvis du er overfølsom (allergisk) overfor tetrasyklin eller et av de andre innholdsstoffene i Tetracyclin Actavis.
- dersom du er gravid.
- dersom du har nedsatt nyre- og leverfunksjon.

Vis forsiktighet ved bruk av Tetracyclin Actavis:

- ved soling. Forsiktighet ved soling tilrådes under og noen dager etter avsluttet behandling. Solarium bør unngås.
- Hos foster og barn kan tetrasykliner gi varige forandringer i tannemalje og tannsubstans, og forbigående forandringer i benvev. Denne effekten er størst hos barn under 12 år. Preparatet bør derfor kun i spesielle tilfelle brukes til barn under 12 år.

Bruk av andre legemidler sammen med Tetracyclin Actavis:

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med visse andre legemidler. Syrenøytraliserende midler, jerntabletter og kalkpreparater svekker virkningen av tetrasyklin. Medisinen bør derfor tas 1 time før eller 2-3 timer etter slike preparater og etter måltider spesielt dersom disse inneholder melkeprodukter. Ved en kort tetrasyklinterapi (1-2 uker), bør det gjøres et opphold i jernbehandlingen.

Inntak av Tetracyclin Actavis sammen med mat og drikke

Tetracyclin Actavis skal ikke tas samtidig med melk.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Tetracyclin Actavis dersom du er gravid.

Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Tetracyclin Actavis ved amming.

Kjøring og bruk av maskiner:

Tetracyclin Actavis antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Tetracyclin Actavis:

Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte lege før du tar dette legemidlet.

3. HVORDAN DU BRUKER TETRACYCLIN ACTAVIS

Bruk alltid Tetracyclin Actavis slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker. Den vanlige dosen er: Voksne: 2 tabletter 2 ganger i døgnet eller 1 tablett 4 ganger i døgnet.

Tablettene bør svelges hele med rikelig drikke (ikke melk), og kan deles ved behov.

En kur bør fullføres slik legen har bestemt, selv om man føler seg bedre.

Dersom du tar for mye av Tetracyclin Actavis:

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Dersom du har glemt å ta Tetracyclin Actavis:

Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.

Dersom du avbryter behandling med Tetracyclin Actavis:

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Tetracyclin Actavis forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Kan gi mave- tarmbesvær i form av kvalme og diaré. Tetrasyklin kan forstyrre balansen mellom mikroorganismer (f.eks. bakterier og sopp), som vi normalt har på hud og slimhinner. Det kan i sjeldne tilfeller gi soppinfeksjon på tunge, i munn, i endetarm og i skjeden. Allergiske reaksjoner, svie og utslett på områder som utsettes for sollys kan forekomme.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

5. OPPBEVARING AV TETRACYCLIN ACTAVIS

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Tetracyclin Actavis etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetning av Tetracyclin Actavis

- Virkestoff er tetrasyklinhydroklorid 250 mg per tablett.

magnesiumstearat, talkum (E553b), laktose, hypromellose (E464), titandioksid (E171), makrogol 4000, kinolingult (E104), jernoksider (E172).

Hvordan Tetracyclin Actavis ser ut og innholdet i pakningen

Tablettene er gule, runde, buede og kan deles. A.L er inngravert på den ene siden.

Plastboks. 32 tabletter og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.

Innehaver av markedsføringstillatelsen:

Actavis Group hf.,
Reykjavíkurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Island

Tilvirker:

Piramal Healthcare UK Limited
Whalton Road Morpeth, Northumberland NE61 3YA, England

For ytterligere informasjon kontakt:

Actavis Norway AS,
Hoffsveien 1 D, Postboks 409 Skøyen, 0213 Oslo
Tlf: 815 22 099

kundeservice@actavis.no

Dette pakningsvedlegg ble sist godkjent 2011-09-15.

Ordforklaringer til teksten