

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Ventoline 0,1 mg/dose, inhalasjonsaerosol, suspensjon salbutamol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
- Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
- Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Ventoline er og hva det brukes mot
2. Hva du må vite før du bruker Ventoline
3. Hvordan du bruker Ventoline
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Ventoline
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ventoline er og hva det brukes mot

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Ventoline inhalasjonsaerosol inneholder et virkestoff, kalt salbutamol. Dette tilhører en gruppe legemidler som kalles hurtigvirkende bronkodilatorer. Hurtigvirkende bronkodilatorer virker på musklene i de små luftveiene i lungene innen få minutter. Ventoline virker ved å utvide bronkiene slik at luftpassasjen i lungene bedres. Effekten varer i minst 4 timer etter en inhalasjon. Ventoline brukes ved astma, kronisk bronkitt, emfysem og andre lungesykdommer der utvidelse av bronkiene er nødvendig.

2. Hva du må vite før du bruker Ventoline

Bruk ikke Ventoline

- hvis du er allergisk (overfølsom) overfor virkestoffet salbutamol eller overfor hjelpestoffet norfluran (drivgass).

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege ved bruk av Ventoline dersom du:

- har tyreotoksikose (tilstand med økt mengde hormon fra skjoldbruskkjertelen)
- har høyt blodtrykk
- har eller tidligere har hatt en hjertesykdom, uregelmessig hjerterytme eller hjertekrampe (såkalt angina)

Hvis effekten av Ventoline blir dårligere, ta kontakt med lege.

Noen mennesker kan få overfølsomhetsreaksjoner (allergiske reaksjoner) ved bruk av legemidler. Dersom du får noen av symptomene som er nevnt nedenfor raskt etter inhalasjon av Ventoline skal du slutte å bruke dette legemidlet, og umiddelbart ta kontakt med lege:

- plutselig hvesing eller tetthet i brystet
- hovne øyelokk, ansikt eller lepper
- hudutslett med hevelser/kuler hvor som helst på kroppen

Andre legemidler og Ventoline

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Effekten kan påvirkes av andre legemidler. Visse blodtrykksmedisiner (betablokkere) kan oppheve effekten av Ventoline.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Forsiktighet bør utvises ved graviditet. Legemidlet går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er lite sannsynlig.

Rådfør deg likevel med lege ved bruk av Ventoline under amming.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, kontakt apotek eller lege.

Ventoline antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

3. Hvordan du bruker Ventoline

Bruk alltid Ventoline slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.

Dose og doseringshyppighet må bare endres i samråd med lege. Effekten av Ventoline varer som regel i minst 4 timer.

Hvis du mener at virkningen av Ventoline er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.

Bruksanvisning

Legen din, helsepersonell eller de ansatte på apoteket bør vise deg hvordan du skal bruke inhalatoren din. Ved jevne mellomrom bør de også sjekke hvordan du bruker inhalatoren. Dersom du ikke bruker Ventoline som anvist eller som forskrevet, kan det føre til at legemidlet ikke virker som det skal. Dersom pasienten er et barn, bør en voksen forsikre seg om at inhalasjonen utføres helt riktig.

Legemidlet ligger inni en trykkbeholder som er festet i en inhalator (av plast) med et munnstykke.

Testing av inhalatoren

1. Når du skal bruke inhalatoren din for første gang, må du sjekke at den virker. Fjern beskyttelseshetten til munnstykket ved å klemme forsiktig på sidene, og trekk den av.

2. Ryst inhalatoren godt, hold munnstykket slik at det peker fra deg og trykk 2 ganger på beholderen for å frigjøre 2 doser i luften. Dersom du ikke har brukt inhalatoren på 5 dager eller mer, skal inhalatoren rystes godt og 2 doser frigjøres i luften for å være sikker på at den virker.

Slik bruker du inhalatoren din

Det er viktig at du starter å puste inn så rolig som mulig rett før du bruker inhalatoren.

1. Stå eller sitt oppreist når du bruker inhalatoren.

2. Fjern beskyttelseshetten til munnstykket (som vist på det første bildet). Sjekk innsiden og utsiden av munnstykket for å forsikre deg om at det er rent, og fritt for fremmedlegemer.

3. Ryst inhalatoren 4 eller 5 ganger for å være sikker på at alle løse gjenstander fjernes, og at innholdet i beholderen blandes godt. Før første gangs bruk eller dersom inhalatoren ikke har vært brukt på 5 dager eller mer, bør 2 doser frigjøres i luften for å være sikker på at den virker.

4. Hold inhalatoren loddrett med tommelen i bunnen, under munnstykket. Pust helt ut, så lenge du synes det er behagelig.

5. Plassér munnstykket i munnen mellom tennene, og lukk leppene rundt. Ikke bit.

6. Pust inn gjennom munnen. Rett etter at du starter å puste inn, trykker du på toppen av beholderen for å frigjøre 1 dose legemiddel. Gjør dette mens du samtidig puster dypt og rolig inn.

7. Mens du holder pusten, tas inhalatoren vekk fra munnen og fingeren vekk fra toppen av inhalatoren. Fortsett å holde pusten så lenge det er komfortabelt.

8. Dersom du skal ta flere doser, skal du holde inhalatoren loddrett og vente i omtrent 30 sekunder mellom hver inhalasjon. Gjenta trinnene 3 til 7.

9. Etter bruk må du alltid sette beskyttelseshetten på munnstykket igjen ved å trykke den på plass.

Viktig:

Man må ta seg god tid til å gjennomføre trinnene 4, 5 og 6. Det er viktig at man starter å puste inn så rolig som mulig rett før dosen frigjøres.

De første gangene bør du øve deg foran et speil. Dersom du ser at det kommer damp fra toppen av inhalatoren eller fra munnvikene dine, bør du begynne på nytt.

Dersom du eller barnet ditt synes det er vanskelig å bruke inhalasjonsaerosolen, kan et inhalasjonskammer gjøre behandlingen med Ventoline enklere. Rådfør deg med legen din, helsepersonell eller de ansatte på apoteket.

Hvordan du rengjør inhalatoren din

For å hindre at inhalatoren din blir tett, er det viktig at den rengjøres minst én gang i uka.

Slik rengjøres inhalatoren:

1. Ta metallbeholderen ut av inhalatoren, og fjern beskyttelseshetten til munnstykket.
2. Skyll inhalatoren grundig under rennende varmt vann.
3. Tørk inhalatoren GRUNDIG både på innsiden og utsiden.
4. Sett metallbeholderen tilbake i inhalatoren, og sett beskyttelseshetten på munnstykket igjen.

DU MÅ IKKE LEGGE METALLBEHOLDEREN I VANN.

Dersom du tar for mye av Ventoline

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Dersom du har fått i deg en større dose enn anbefalt, er det større sannsynlighet for at du kan få bivirkninger som raskere hjerteslag, hodepine og at du føler deg skjelven eller rastløs (se avsnittet Mulig bivirkninger).

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Dersom din pust eller hvesing forverres rett etter inhalasjon av dette legemidlet, må du stoppe umiddelbart og ta kontakt med lege. Hvis du har tilgjengelig en annen type hurtigvirkende astmamedisin bør du prøve den så snart som mulig. Legen din vil vurdere om behandlingen bør fortsettes med en annen hurtigvirkende astmamedisin.

Som alle legemidler kan Ventoline forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Bivirkninger er listet etter hvor i kroppen de finner sted og hyppighet. Hyppighet er definert som: svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter), vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 100 pasienter, men færre enn 1 av 10 pasienter), mindre vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 1000 pasienter, men færre enn 1 av 100 pasienter), sjeldne (forekommer hos flere enn 1 av 10.000 pasienter, men færre enn 1 av 1000 pasienter), og svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10.000 pasienter) inkludert isolerte tilfeller.

Forstyrrelser i immunsystemet

Svært sjelden:

Overfølsomhetsreaksjoner inkludert hevelser (ødem), elveblest, innsnevring av bronkiene (luftrørsforgreningene), lavt blodtrykk og kollaps

Stoffskifte- og ernæringsbetingede sykdommer

Sjelden: Nedsatt nivå av kalium i blodet

Sykdommer i nervesystem

Vanlig: Skjelving, hodepine

Svært sjelden: Hyperaktivitet

Hjertesykdommer

Vanlig: Raskere puls og/eller kraftigere hjerteslag enn vanlig

Mindre vanlig: Hjerterbank (palpasjoner)

Svært sjelden:

Forstyrrelser i hjerterytmen (arytmier, inkludert ujevn takt og styrke av puls og hjerteslag, økt puls og ekstra hjerteslag)

Selv om det er ukjent hvor ofte dette forekommer, kan noen personer av og til oppleve brystmerter (på grunn av hjerteproblemer som hjertekrampe, såkalt angina). Rådfør deg med legen din dersom du utvikler disse symptomene under behandling med salbutamol. Du må ikke avslutte behandlingen uten å ha rådført deg med legen din først.

Sykdommer i blodårene

Sjelden:

Utvidelse av blodårene

Sykdommer i luftveiene

Svært sjelden:

Kortvarig pustebesvær i forbindelse med selve inhalasjonen (paradoksalt bronkospasme)

Sykdommer i fordøyelsessystem

Mindre vanlig:

Irritasjon i munn og svelg

Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett

Mindre vanlig:

Muskelkramper

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan du oppbevarer Ventoline

Etter bruk skal beskyttelseshetten settes på munnstykket igjen ved å trykke den på plass.

Bruk ikke Ventoline etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25 °C. Beskyttes mot frost og direkte sollys. Hvis metallbeholderen er kald ved bruk, kan virkningen bli dårligere.

Trykkbeholder. Må ikke punkteres, ødelegges eller brennes selv om den er tom.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ventoline

- Virkestoff er salbutamolsulfat tilsvarende salbutamol 0,1 mg.
- Andre innholdsstoffer er norfluran (1,1,1,2-tetrafluoretan).

Hvordan Ventoline ser ut og innholdet i pakningen:

Inhalasjonsaerosol, suspensjon. Trykkbeholderen inneholder 200 doser.

-

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen

GlaxoSmithKline AS

Forskningsveien 2a

Postboks 180 Vinderen

0319 Oslo

Tlf: 22 70 20 00

Faks: 22 70 20 03

E-post: firmapost@gsk.no

Tilvirker

Glaxo Wellcome Production, Evreux, Frankrike

eller

Glaxo Wellcome SA, Burgos, Spania.

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 17.02.2014.

Ordforklaringer til teksten